

9 Pro systém kontrol během přípravy a podání léčiv platí:

- a) je dostatečný, zaměstnanci jsou pravidelně školeni pomocí standardních operačních postupů.
- b) kontrola totožnosti pacienta je často porušována
- c) nezávislá kontrola druhou sestrou během přípravy se ukázala být nadbytečná a nákladově neefektivní
- d) jeho porušování představuje velký systémový problém, který lze snížit zejména díky využití informačních technologií

10 Které významné obsahové látky najdeme v rozmarýnu lékařském?

- a) silice, deriváty kyseliny skořicové a triterpeny oleanového a ursanového typu
- b) flavonoidy, isoflavonoidy, kumariny
- c) kyselina rozmarýnová, kyselina karnosová, karnosol
- d) silice, kyselina linolová a gama-linolenová

11 Při jakých onemocněních je použití rozmarýnu kontraindikováno?

- a) chronické onemocnění ledvin a výskyt ledvinových kamenů
- b) neprůchodnost žlučovýchodů, výskyt žlučových kamenů a u jiných chorob žlučových cest
- c) epilepsie a bipolární porucha
- d) těžké poruchy krevního oběhu a srdeční selhání, vysoké horečky, těžké infekce

12 U které obsahové látky rozmarýnu je znám mechanismus jejího antiflogistického působení?

- a) borneol
- b) rosmanol
- c) karnosol
- d) cineol

13 Míra sebejistoty farmaceutů při poskytování odborných informací pacientům ohledně léčby DOAC statisticky významně souvisela s:

- a) typem lékárny, kde farmaceuti vydávali léčivé přípravky
- b) poskytováním klinicko-farmaceutické péče
- c) dosaženým vzděláním farmaceutů v oboru
- d) specializovanou způsobilostí farmaceutů

14 Dotazníkové šetření zaměřené na názory a postoje farmaceutů v České republice k přímým perorálním antikoagulantům (DOAC) – vyberte pravdivá tvrzení:

- a) pro účast ve studii byli osloveni farmaceuti a lékaři z celé České republiky
- b) pro účast ve studii byli osloveni farmaceuti z celé České republiky
- c) pro účast ve studii byli osloveni farmaceuti z České republiky a Slovenska
- d) pro účast ve studii byli osloveni farmaceuti ze třech vybraných Okresních sdružení lékárníků

15 Vyberte nepravdivá tvrzení ohledně názorů respondentů na adherenci pacientů užívajících DOAC:

- a) tři čtvrtiny dotázaných považovaly adherenci k léčbě DOAC za dostačující
- b) většina respondentů považovala adherenci k léčbě DOAC za nedostatečnou
- c) za nástroj na podporu adherence k léčbě s nejvyšším významem považovali respondenti činnosti patientských organizací
- d) za nástroj na podporu adherence k léčbě s nejvyšším významem považovali respondenti dávkače na léky a motivační rozhovory s pacientem

16 Jaká jsou aktuální doporučení při užívání přípravků s obsahem pseudoefedrinu?

- a) v případě užívání pseudoefedrinu nejsou nutná žádná omezení
- b) léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu nesmí užívat pacienti se závažnou hypertenzí
- c) pacient musí přerušit užívání v případě výskytu příznaků jako jsou bolest hlavy s náhlým nástupem, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost, křeče a poruchy zraku, které mohou ukazovat na reverzibilní encefalopatii v zadní oblasti nebo syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce
- d) nedoporučuje se podávat jej pacientům s vyššími stupni renálního selhávání

17 Antihistaminikum bilastin se správně podává:

- a) 1 hod před jídlem nebo 2 hod po jídle nebo po ovocné šťávě
- b) nezávisle na příjmu potravy
- c) krátce po jídle a doporučuje se zapít nejlépe ovocným džusem nebo šťávou
- d) krátce po jídle a doporučuje se zapít mlékem

18 Vyberte typické příznaky alergické rýmy:

- a) ucpaný nos, hlenovitá sekrece, slzení a červené oči, horečka
- b) ucpaný nos, vodnatá sekrece, slzení a červené oči, svědění v nose, kýchání
- c) u dětí ucpaný nos, vodnatá sekrece, často kašel
- d) ucpaný nos, hlenovitá sekrece, oční potíže obvykle nejsou přítomné

19 Suplementace sodíkových iontů je obvykle indikována u:

- a) poruch srdečních funkcí
- b) pacientů se stomií
- c) pacientů s chronickými renálními ztrátami
- d) u podvyživených pacientů

20 Kalii chloridum – správné dávkování suplementace u dospělých:

- a) v ČL 2023 nejsou stanoveny doporučené terapeutické dávky
- b) p. o.: jednotlivá dávka 0,5–1,0 g, denní dávka 2,0–4,0 g
- c) p. o.: denní dávka 1,0–12,0 g
- d) p. o.: 1–2 mmol/kg/den v rozdělených dávkách